

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP - 2 - 8 - 77135415
**BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES**

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION POITOU - CHARENTES
CHARENTE - CHARENTE-MARITIME - DEUX-SEVRES - VIENNE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
ROUTE DE VASLES - BIARD - 86000 POITIERS - TEL. (49) 88.35.55

ABONNEMENT ANNUEL 50 F.

C. C. P. LIMOGES 4.752.22.X
Sous Régisseur de recettes et d'avances
AVERTISSEMENTS AGRICOLES
Rte de Vasles - Biard - 86000 POITIERS

BULLETIN N° 89 - 29 JUILLET 1977

VIGNE

MILDIOU

La maladie reste en progression, favorisée par une hygrométrie élevée et l'absence de fortes chaleurs. Actuellement, peu de parcelles sont totalement indemnes de taches, certaines étant même fortement envahies. Compte-tenu de la végétation toujours active et de la sensibilité des grappes dont le développement accuse un retard appréciable, il convient de rester vigilant et d'assurer la protection.

Le traitement préconisé le 20, a été le plus souvent délavé et un nouveau traitement général s'impose. Il sera effectué très soigneusement en couvrant bien l'ensemble de la végétation et exécuté, si possible, après un rognage.

Rot gris et rot brun sont fréquents dans les vignobles très contaminés. Il s'avère difficile d'en stopper l'évolution, le champignon évoluant à l'intérieur de la rafle et gagnant de proche en proche les baies.

BOTRYTIS

Le stade de fermeture de la grappe sera progressivement atteint à partir de la semaine prochaine, selon les cépages et les situations des parcelles. Nous rappelons que le deuxième traitement du programme standard se situe à ce moment.

VERS de la GRAPPE

Tout comme en première génération, les niveaux d'infestation sont extrêmement faibles. Par conséquent, aucun traitement systématique ne s'impose.

Il n'y a que dans les vignes où des toiles ont été trouvées au moment de la floraison, qu'un traitement pourra éventuellement être réalisé vers la fin de la semaine prochaine.

POMMIER POIRIER

TAVELURE

Les pluies actuelles risquent d'aggraver encore une situation déjà très mauvaise. Dès qu'il sera possible d'entrer dans les vergers, une nouvelle couverture fongicide devra être appliquée impérativement. L'emploi de produits systémiques pourra améliorer le contrôle des contaminations sur feuilles, mais l'effet curatif sur fruits n'est pas total.

...7.2.89

CARPOCAPSE

En raison des conditions très défavorables aux pontes en début de premier vol, il y a eu très peu de pénétrations avant le début Juillet. En outre, le développement des larves est ralenti par le temps relativement froid que nous connaissons actuellement. En conséquence, nous prévoyons l'absence totale d'un deuxième vol dans les secteurs les plus froids de la région (Gâtines) et un risque extrêmement faible ailleurs, ne nécessitant tout au plus qu'un traitement tardif.

Attendre un prochain avis pour plus de précisions.

TABAC

MILDIOU

Continuer d'assurer soigneusement les traitements systématiques, une certaine recrudescence étant à craindre si les pluies persistent.

Le Chef de la Circonscription Phytosanitaire
" POITOU-CHARENTES "

R. GUILLEMENET

Imprimé à la Station le 29 Juillet 1977 - Précédente Note : Bulletin N° 88 -20.07.77

N° du papier de presse : 535 AD .